

Co je HPV?

Až 80 % mužů i žen se někdy v životě setká s virem HPV, ale zatímco u většiny z nich infekce bez příznaků odezní, u přibližně 10 % nakažených HPV se mohou rozvinout určitá prekancerózní onemocnění, která mohou vést až k rakovině.

HPV SE PŘENÁŠÍ intimním kontaktem

HPV se přenáší dotykem infikovaných tkání, proto ani kondom nepředstavuje 100% ochranu před HPV, protože chrání jen tkáň kondomem pokryté. K přenosu může dojít i bez pohlavního styku, například mazlením. HPV infekce má často bezpříznakový průběh, nakažený o ní nemusí vědět a může ji přenášet dál.



Co je HPV?

Jednotlivých HPV virů je mnoho, jen několik jich je ale vysoce rizikových a ty způsobují přibližně 90 % případů rakoviny děložního čípku na celém světě. Typy HPV s nízkým rizikem rakoviny jsou pak zodpovědné za přibližně 90 % genitálních bradavic.

Na rakovinu děložního čípku v České republice v roce 2021 zemřela každých 29 hodin jedna žena.

HPV způsobuje i další onemocnění.

Genitální bradavice

Mohou se objevit u dětí, žen i mužů a jedná se o nepříjemné onemocnění, které se může vracet.

Rakovina análního otvoru

Anální otvor, ale i pochva a zevní genitál mohou být místem rozvoje karcinomu způsobeného HPV infekcí.

Předrakovinné změny, tzv. prekancerózy HPV, mohou způsobit změny ve tkáni, které nejsou nádorem, ale mohou vést k jeho rozvoji.

INTIMNÍ život

Infekce HPV nemusí souviset jen s promiskuitním způsobem života. Statisticky nižší počet sexuálních partnerů sice znamená nižší riziko nákazy HPV, ale nakazit se můžete i od prvního intimního partnera.

Pozor, spolehlivou ochranu proti HPV nepředstavuje ani kondom, k přenosu HPV totiž může dojít na nechráněné části pokožky.



JAK SNÍŽIT RIZIKO HPV onemocnění

PREVENTIVNÍ GYNEKOLOGICKÉ PROHLÍDKY

Každá žena by měla absolvovat preventivní gynekologickou prohlídku alespoň jednou za rok. Během prohlídky gynekolog provádí **stěr z děložního čípku (tzv. cytologii)**, který dokáže včas odhalit případné změny v buněčné tkáni. Dalším nástrojem prevence je HPV DNA test, který je ženám ve věku 35, 45 a 55 let hrazen ze zdravotního pojištění.

Vynechávání pravidelných gynekologických prohlídek zvyšuje riziko pozdního zachycení zhoubných onemocnění.

Poradte se se svým gynekologem

o možnostech očkování proti HPV

Ochrana


GARDASIL®9

Gardasil®9, injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce, 9valentní očkovací látka proti lidskému papilomaviru [typy 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58] (rekombinantní, adsorbovaná). Vakcína Gardasil®9 je určena dětem (od věku 9 let) i dospělým.

Tak jako všechny očkovací látky, ani vakcína Gardasil®9 nemusí plně chránit každého. Přečtěte si pečlivě příbalovou informaci o léčivém přípravku. Léčivý přípravek je plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění pro děti ve věku 11 až 14 let včetně.

Pro ostatní pacienty není léčivý přípravek hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Přípravek je vázán na lékařský předpis.

 MSD

Copyright © Merck Sharp & Dohme s.r.o., 2024.
Všechna práva vyhrazena.
Merck Sharp & Dohme s.r.o.
Na Valentině 3336/4, 150 00 Praha 5, Česká republika.
Tel.: +420233010111
E-mail: dpoc_czechslovak@merck.com
www.msd.cz

Datum přípravy: 04/2024 CZ-GSL-00656 (2.0)

ANO! prevenci

Samotnou infekci HPV nelze léčit, je možné pouze předcházet případným HPV asociovaným onemocněním, jak u mužů, tak u žen:

- genitální bradavice
- předrakovinné změny (tzv. prekancerózy) v oblasti vagíny, zevních rodidel, děložního čípku, ale i análního otvoru
- rakovina děložního čípku, vagíny, zevních rodidel a análního otvoru

Přestože neexistuje specifická léčba HPV infekce, prekancerózy se dají úspěšně léčit např. konizací. Ta však může v některých případech zvyšovat riziko neúspěchu těhotenství.

Očkováním a pravidelnými preventivními prohlídkami lze předcházet některým HPV onemocněním.

Vakcína proti HPV bývá spojována pouze s dětmi ve věku 11–14 let včetně, které ji mají hrazenou ze zdravotního pojištění.

UŽ MÉNĚ SE ALE VÍ, ŽE VAKCÍNA JE VHODNÁ I PRO STARŠÍ 15 LET,
jak pro ženy, tak pro muže.



NA VAŠEM ZDRAVÍ
záleží.

OČKOVÁNÍ

OČKOVÁNÍ PROTI HPV MÁ SMYSL i v dospělosti

Vakcína Gardasil®9 slouží jako jedna z nejúčinnějších prevencí proti 9 typům lidských papilomavirů, z nichž některé mohou způsobovat např. až 90 % rakovin děložního čípku a jiné až 90 % genitálních bradavic. Mnoho lidí navíc nemá žádné příznaky a mohou být přenašeči infekce, aniž by o tom věděli.

I v případě předchozí infekce některým typem HPV poskytuje očkování prevenci před dalšími typy HPV obsaženými ve vakcíně.

GARDASIL®9

Vakcínu je možné aplikovat i během kojení nebo během užívání hormonální antikoncepce. Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou lokální reakce v místě vpichu, jako je zarudnutí, otok či bolestivost, a také bolest hlavy. Přípravek Gardasil®9 nemůže způsobit onemocnění související s HPV.

U žen a mužů starších 15 let se používá třídávkové očkovací schéma

1. dávka
dnes

2. dávka
2 měsíce
po 1. dávce

3. dávka
6. měsíc
po 1. dávce

JAK SE OBJEDNAT NA OČKOVÁNÍ proti HPV

Na očkování proti HPV se můžete objednat u svého praktického lékaře, gynekologa nebo v očkovacím centru.

Muži se mohou nechat očkovat svým ošetřujícím praktickým lékařem nebo v očkovacím centru.

Děti očkuje ošetřující pediatr.



Více o HPV, prevenci a očkování najdete na webu **mluvmeohpv.cz**.



„Víš, že očkování proti HPV má smysl i v dospělosti?“

MLUVME O HPV

HPV může způsobit některé druhy rakoviny, přitom ale existuje očkování, které může poskytovat prevenci proti 90 % rakovin děložního čípku a proti 90 % genitálních bradavic.



Chci s tebou mluvit
o HPV