

Co je HPV?

Až 80 % mužů i žen se někdy v životě může setkat s virem HPV. A zatímco u většiny z nich infekce bez příznaků odezní, u přibližně 10 % nakažených HPV se mohou rozvinout určitá prekancerózní onemocnění, která mohou vést až k rakovině.

HPV SE PŘENÁŠÍ intimním kontaktem

HPV se přenáší dotykem infikovaných tkání, proto ani kondom nepředstavuje 100% ochranu před HPV, protože chrání jen tkáň kondomem pokryté. K přenosu může dojít i bez pohlavního styku, například mazlením. HPV infekce má často bezpříznakový průběh, nakažený o ní nemusí vědět a přenáší ji dál.

Co je HPV?

Co HPV může ZPŮSOBIT

Jednotlivých HPV virů je mnoho, jen několik jich je ale vysoce rizikových a ty způsobují přibližně 90 % případů rakoviny děložního čípku na celém světě. Typy HPV s nízkým rizikem rakoviny jsou pak zodpovědné za přibližně 90 % výskytů genitálních bradavic.

HPV bývá spojován jen se ženami a rakovinou děložního čípku. Ale HPV může ohrozit i muže.

HPV může mužům způsobit některá onemocnění.

Anální otvor může být místem rozvoje karcinomu způsobeného infekcí HPV. A netýká se to jen homosexuálních mužů.

Předrakovinné změny análního otvoru, tzv. prekancerózy HPV, mohou způsobit změny ve tkáni, které nejsou nádorem, ale mohou vést k jeho rozvoji.

INTIMNÍ život

Infekce HPV nemusí souviset jen s promiskuitním způsobem života. Statisticky nižší počet sexuálních partnerů sice znamená nižší riziko nákazy HPV, ale nakazit se můžete i od prvního intimního partnera.

Pozor, spolehlivou ochranu proti HPV nepředstavuje ani kondom, k přenosu HPV totiž může dojít na nechráněné části pokožky.

NEPODCEŇUJTE prevenci

U žen se HPV v mnoha případech projevuje změnami na děložním čípku, každá žena má ale nárok na pravidelný každoroční screening děložního čípku.

Muži takové preventivní prohlídky nemají. Proto by měli tím spíš zvážit možná preventivní opatření a také věnovat více pozornosti případným prvním příznakům potíží, jako je například krvácení z análního otvoru. V takových případech ihned vyhledejte lékaře.

Ochrana

Poradte se se svým lékařem

o možnostech očkování proti HPV


GARDASIL®9

Gardasil®9, injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce, 9valentní očkovací látka proti lidskému papilomaviru [typy 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58] (rekombinantní, adsorbovaná). Vakcína Gardasil®9 je určena dětem (od věku 9 let) i dospělým.

Tak jako všechny očkovací látky, ani vakcína Gardasil®9 nemusí plně chránit každého. Přečtěte si pečlivě příbalovou informaci o léčivém přípravku. Léčivý přípravek je plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění pro děti ve věku 11 až 14 let včetně.

Pro ostatní pacienty není léčivý přípravek hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Přípravek je vázán na lékařský předpis.

 **MSD**

Copyright © Merck Sharp & Dohme s.r.o., 2024.
Všechna práva vyhrazena.
Merck Sharp & Dohme s.r.o.
Na Valentině 3336/4, 150 00 Praha 5, Česká republika.
Tel.: +420 233 010 111
E-mail: dpoc_czechslovak@merck.com
www.msd.cz

Datum přípravy: 06/2024 CZ-GSL-00878 (1.0)

ANO! Očkování

Samotnou infekci HPV nelze léčit, léčí se pouze případná HPV asociovaná onemocnění, jak u mužů, tak u žen:

- genitální bradavice
- předrakovinné změny (tzv. prekancerózy) análního otvoru
- rakovina análního otvoru

Proti těmto onemocněním existuje prevence v podobně očkování.

V obecném povědomí je vakcína proti HPV spojována s dětmi ve věku 11–14 let včetně, pro které je očkování hrazeno ze zdravotního pojištění.

**ALE OČKOVÁNÍ
MÁ SMYSL
I V DOSPĚLOSTI.**
Pro ženy i pro muže



**NA VAŠEM
ZDRAVÍ**
záleží

OČKOVÁNÍ

OČKOVÁNÍ JE JEDNA Z NEJÚČINNĚJŠÍCH PREVENCÍ proti HPV

Vakcína Gardasil®9 slouží jako prevence proti 9 typům lidských papilomavirů, které mohou u mužů způsobit genitální bradavice nebo předrakovinné změny v oblasti análního otvoru, které mohou vést až k rakovině.

I v případě předchozí infekce některým typem HPV poskytuje očkování prevenci před některými onemocněními způsobenými jiným typem HPV obsaženým ve vakcíně.


GARDASIL®9

Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou lokální reakce v místě vpichu, jako je zarudnutí, otok či bolestivost, a také bolest hlavy.

**U žen a mužů starších 15 let se používá
třídávkové očkovací schéma**

1. dávka
dnes

2. dávka
2 měsíce
po 1. dávce

3. dávka
6. měsíc
po 1. dávce

JAK SE OBJEDNAT NA OČKOVÁNÍ proti HPV

Na očkování proti HPV se můžete objednat u svého praktického lékaře nebo v očkovacím centru.



Více o HPV, prevenci
a očkování najdete na webu
mluvmeohpv.cz.



„Viš, že HPV může
ohrozit i nás muže?“

MLUVME O HPV

U žen i mužů může HPV způsobit některé druhy rakoviny, přitom ale existuje očkování, které může poskytovat například prevenci proti 90 % rakovin análního otvoru souvisejících s HPV a proti 90 % genitálních bradavic.



Chci s tebou mluvit
o HPV