

Velikost: 210 x 165 mm po složení

KONIZACE

Informace pro pacienty

Změny na děložním čípku se mohou vyvíjet několik let bez jakýchkoli příznaků, jsou různě závažné a obecně je lze klasifikovat jako mírné, střední nebo těžké.

U středně závažných a těžkých změn se zpravidla upřednostňuje **chirurgické ošetření děložního čípku – takzvaná konizace**.


Konizace je malý chirurgický zákrok, který se používá buď za účelem **diagnostiky**, nebo i v rámci **léčby karcinomu děložního hrdla**.

Ve velké většině případů je tento výkon **dostačující** a není potřeba další operace.

Jak konizace probíhá?

V současnosti se konizace provádí nejčastěji vysokoodporovým drátkem, takzvanou **elektrokoagulační kličkou** nebo **jehlou**, případně **laserem**.

- Zákrok obvykle probíhá v krátkodobé **celkové anestezii** nebo v **místním znecitlivění**.
- Přístup k děložnímu čípku se provádí přes pochvu, a následně se odstraní postižená část čípku ve tvaru kužele nebo válce – **konus**.



- Vzorek tkáně bude podroben **mikroskopickému vyšetření**. Tím lze získat **důležité informace** o povaze a rozsahu případných změn tkáně.
- Konizace je zároveň **léčebný výkon**, který odstraní postiženou část čípku.

Co lze očekávat po zákroku?



Může dojít k mírnému krvácení



Dohojování čípku probíhá přibližně 6 týdnů



Předpokládaná doba hospitalizace je 1 den



Dodržování **hygienických pokynů** a omezení některých aktivit dle doporučení lékaře

V období hojení děložního čípku:

- Vyhněte se **pohlavnímu styku** po dobu, kterou stanoví lékař, aby se minimalizovalo riziko možné infekce.
- Po dobu hojení čípku je bezpodmínečně nutné dodržovat přísný hygienický režim. Upřednostněte **sprchování** před použitím vany. Nekoupejte se ve veřejných bazénech nebo koupalištích.
- Vyhněte se používání **tamponů** a **menstruačních kalíšků**.
- První týden až dva po operaci je doporučován **klidový režim**. Vyhněte se **intenzivní fyzické aktivitě**, zvedání těžkých břemen, namáhavé činnosti, sportu.
- V případě **podezření na vážnou pooperační komplikaci** (horečka, silné bolesti, silné krvácení, zástava větrů a stolice, zvracení...) a neprodleně informujte lékaře.

Možné pooperační komplikace:



Infekce. Jakýkoli chirurgický zákrok nese určité riziko infekce, která se může objevit u operační rány, v dutině břišní či močových cestách.



Krvácení. Po konizaci může dojít k mírnému krvácení. Většina případů se však zastaví sama.



Porucha vyprazdňování. Velmi vzácně se může objevit dočasná porucha vyprazdňování močového měchýře a střevních kliček, která může pozvolna, během několika dnů, odeznít.



Krevní sraženiny. Velmi vzácná je trombóza, tj. vznik krevních sraženin v žilách např. pánevního dna, a embolie, tedy zanesení těchto sraženin například do plic.



Psychické problémy. Některé ženy mohou cítit úzkost z obavy o výsledky a možné komplikace. Vědomí nutnosti tohoto zákroku kvůli potenciálně vážnému onemocnění může také vyvolat emocionální zátěž. Objevit se mohou úzkosti a deprese, spolu s přetrvávající únavou.



Těhotenství. V některých případech (zejména pokud se jedná o opakovaný výkon) se může zvyšovat riziko neúspěchu těhotenství, tedy potratu či předčasného porodu.

Dodržujte lékařem stanovená doporučení a v případě jakýchkoliv komplikací je s lékařem konzultujte.

Má zákrok vliv na další život?

Operace by neměla mít trvalý vliv na váš sexuální život nebo celkovou kvalitu života.



HPV infekce – příčina onemocnění



- **Lidským papilomavirem (HPV)** se během života nakazí 80 % žen i mužů. Ve většině případů spontánně vymizí.
- Zhruba u **10 % nakažených** se mohou vyskytnout různé formy zhoubných či nezhoubných onemocnění. Není možné určit u koho se tyto onemocnění související s HPV projeví.
- HPV se šíří se zejména **pohlavním stykem a dotykem kůže či sliznic**.
- **Téměř 100 % případů rakoviny děložního čípku** způsobují vysoce rizikové typy HPV.
- Infekce HPV může způsobit **další vážné komplikace**: zejména genitální bradavice, ale také rakovinu vulvy a vagíny, rakovinu anu (řitního otvoru).
- HPV infekci nelze vyléčit. Jedním z **účinných způsobů prevence určitých onemocnění souvisejících s HPV je očkování**.

Copyright © Merck Sharp & Dohme s.r.o., 2024.
Všechna práva vyhrazena.

Merck Sharp & Dohme s.r.o.
Na Valentine 3336/4
150 00 Praha 5, Česká republika

tel.: +420 233 010 111, www.msd.cz, e-mail: dpoc_czechslovak@merck.com



Má smysl nechat se ještě očkovat?

- Očkování je neúčinnější, je-li podáno před zahájením sexuálního života, a tedy před možným prvním setkáním s HPV virem.
- **Očkování proti HPV má ale smysl i v dospělosti.** Pokud jste se již s nějakým HPV virem setkala, očkování vám stále **nabízí prevenci** před určitými onemocněními souvisejícími s dalšími typy HPV, obsaženými v očkovací látce.
- **Gardasil®9**, injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce, **9valentní očkovací látka proti lidskému papilomaviru** [typy 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58] (rekombinantní, adsorbovaná).
- Vakcína Gardasil®9 může poskytovat až **90% prevenci proti rakovině děložního čípku a až 90% prevenci proti genitálním bradavicím**.

Navštivte stránku
mluvmeohpv.cz/pro-zeny/



Gardasil®9, injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce, 9valentní očkovací látka proti lidskému papilomaviru [typy 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58] (rekombinantní, adsorbovaná). Vakcína Gardasil®9 se podává injekčně ve 2 dávkách (u dětí před dosažením 15. narozenin) nebo ve 3 dávkách. Tak jako všechny očkovací látky ani vakcína Gardasil®9 nemusí plně ochránit každého. Přechtěte si pečlivě příbalovou informaci o léčivém přípravku. Přípravek je vázán na lékařský předpis. Pro kohortu dívek a chlapců od dovršeného 11. do dovršeného 14. roku je plně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Pro ostatní pacienty a pacienty není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

REFERENCE: 1. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/104174/9789241506779_eng.pdf?sequence=1, 11.4.2024. 2. <https://www.nzip.cz/rejstrikovy-pojem/4300>, 11.4.2024. 3. <https://www.nzip.cz/clanek/1503-konizace-delozniho-cipku>, 3.4.2024. 4. https://www.upmd.cz/wp-content/uploads/2019/11/Informace-pro-pacientky_-Konizace-a-kyret%C3%A1%C5%BE-d%C4%9Blo%C5%BEn%C3%ADho-hrda-_%C4%8D%C3%ADpku_verze-01.pdf, 3.4.2024. 5. https://www.informovanypacient.cz/wp-content/uploads/2021/10/1633698152_IS-GPK-107-Konizace-delozniho-cipku.pdf, 3.4.2024. 6. <https://www.cervix.cz/cs/verejnost/prevence-a-screening-rakoviny-delozniho-cipku/>, 3.4.2024. 7. <https://www.nzip.cz/clanek/1338-rakovina-delozniho-cipku-priciny-a-priznaky>, 3.4.2024. 8. Petca A, Borislavski A, Zvanca ME, Petca RC, Sandru F, Dumitrascu MC. Non-sexual HPV transmission and role of vaccination for a better future (Review). Exp Ther Med. 2020 Dec;20(6):186. doi: 10.3892/etm.2020.9316. Epub 2020 Oct 13. PMID: 33101476; PMCID: PMC7579832. 9. <https://www.hpv-college.cz/prevence>, 19.3.2024. 10. Cull A, Cowie V, Farquharson D, et al. Early stage cervical cancer: psychosocial and sexual outcomes of treatment. Br J Cancer 68, 1216–1220 (1993). <https://doi.org/10.1038/bjc.1993.507>. 11. Heinzel J, Brucker J, Bruckner J, Dinkic C, Hoffmann J, Dornhöfer N, Seitz S, Sohn C, Rom J, Schott T, & Schott S. (2018). Impact of a cervical dysplasia and its treatment on quality of life and sexual function. Archives of Gynecology and Obstetrics, 298, 737-745. <https://doi.org/10.1007/s00404-018-4853-y>. 12. Adjei Boakye E, McKinney SL, Whittington KD, et al. Association between sexual activity and human papillomavirus (HPV) vaccine initiation and completion among college students. Vaccines (Basel) 2022;10:2079. 13. Gardasil®9 injekční suspenze. Merck Sharp & Dohme B.V. Souhrn údajů o přípravku. Dostupný z: https://prehledy.sukl.cz/prehled_leciv.html#/detail-reg/0210636, 19.3.2024. 14. WHO - Questions and Answers about HPV Vaccination, 2017. 15. <https://www.nzip.cz/clanek/52-infekce-lidskymi-papilomaviry-hpv>, 3.4.2024.