DŮLEŽITÉ: před použitím si přečtěte tuto brožuru CS

Návod k použití

WINREVAIR® sotatercept

45 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok (souprava se 2 injekčními lahvičkami)
60 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok (souprava se 2 injekčními lahvičkami)

Tato brožura obsahuje pokyny, jak připravit a aplikovat přípravek Winrevair ve formě prášku a rozpouštědla pro injekční roztok. Příbalová informace, která je rovněž součástí balení, obsahuje všechny pro Vás důležité informace.

Dávka je založena na pacientově tělesné hmotnosti
Pouze pro podkožní (s.c.) injekci (injikujte přímo pod kůži)

Důležité
Promíchejte
Smíchejte
Natáhněte
Injikujte

Obsah brožury:

Důležité informace pro zdravotníky 3
Dříve než začnete 4
Seznamte se s částmi obsaženými v balení 6
Co je důležité vědět před podáním injekce 8
Jak balení uchovávat. 9

Začínáme. 10
Lék v prášku **smíchejte** do tekuté formy 12
Smíchejte lék z obou injekčních lahviček 24
Natáhněte předepsanou dávku 30
Lék si **injikujte** 36

Likvidace přípravku Winrevair 38
Často kladené otázky 40

70121248/00-2

Důležité informace pro zdravotníky

Zdravotnický pracovník poskytne školení týkající se správné přípravy a podávání přípravku Winrevair krok za krokem podle této brožury „Návod k použití“ a rozhodne, zda pacient nebo pečovatel jsou schopni přípravek Winrevair připravovat a podávat samostatně.

Přesvědčte se, že pacient nebo pečovatel dokážou správně udělat následující:

1. Rekonstituovat lék
2. Smíchat lék z obou injekčních lahviček
3. Odměřit správné množství léku podle pacientova lékařského předpisu
4. Zvolit a připravit správné místo k podání injekce
5. Lék podkožně injikovat

Dříve než začnete

Přečtěte si tuto brožuru

Před prvním použitím přípravku Winrevair a před každým dalším podáním si od začátku do konce přečtěte tyto pokyny. Mohou v nich být nové informace.

Začínejte pod dohledem lékaře nebo zdravotní sestry

Přípravek Winrevair nepoužívejte, dokud Vám nebo Vašemu pečovateli lékař nebo zdravotní sestra neukážou, jak jej správně připravit a injikovat. Lékař nebo zdravotní sestra Vám mají před prvním použitím ukázat, jak přípravek Winrevair injikovat.

Máte nějaké otázky?

Pokud se ke správnému podávání přípravku Winrevair chcete na něco zeptat, nebo pokud potřebujete další informace, poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

70121248/00-2

Důležité

? Jak se přípravek používá

Před podáním injekce se ujistěte, že jste si přečetli všechny pokyny uvedené v této brožuře, abyste si podali správnou dávku léku.

- **Smíchejte** lék v 1. injekční lahvičce
- **Smíchejte** lék ve 2. injekční lahvičce
- **Smíchejte** lék z obou injekčních lahviček
- Ze 2. injekční lahvičky **natáhněte předepsanou dávku**
- Poté budete připraveni si **lék injikovat**

Pokračujte na následujících stránkách, které popisují postup krok za krokem.

Seznamte se s částmi obsaženými v balení

Horní vložka v krabičce: používá se ke **smísení** léku



A **2 Injekční lahvičky s práškem přípravku** Winrevair

B **2 Předplněné injekční stříkačky (rozpouštědlo)** se **sterilní vodou** ke smísení léku na tekutinu

C **2 Adaptéry** na injekční lahvičku (dále jen „adaptér“) sloužící k propojení injekční lahvičky a injekční stříkačky

70121248/00-2

Spodní vložka v krabičce:

používá se k **injekčnímu podání** léku



D

1 Injekční jehla

E



1 Prázdná injekční stříkačka sloužící k odměření, natažení a injekčnímu podání léku

F

8 Tampónů s alkoholem (4 v každé části)

Co je důležité vědět před podáním injekce

- Před použitím musíte tento přípravek promísit. Přesvědčte se, že při podání injekce je prášek s lékem v injekční lahvičce zcela rozpuštěn.
- **Při každém podání přípravku zkontrolujte předepsanou dávku (množství v mililitrech). Předepsaná dávka se může měnit.**
- Při přípravě Vaší předepsané dávky používejte pouze pomůcky obsažené v balení.
- Balení neotevírejte ani lék nesmíchávejte, dokud nebudete připraveni jej použít.
- **Žádné pomůcky nepoužívejte opakovaně.** Po podání injekce veškerý nepoužitý léčivý přípravek a použité pomůcky zlikvidujte v souladu s místními požadavky.
  Viz strany 38–39, kde naleznete další informace.

70121248/00-2

Důležité

Jak balení uchovávat

- Celé balení uchovávejte v chladničce, ale chraňte před mrazem.
- Lék a pomůcky uchovávejte v balení a chraňte před světlem.
- Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí a domácích zvířat.

Začínáme

Každý pacient nebo pečovatel, který má připravovat a injikovat přípravek Winrevair, musí být nejprve proškolen zdravotníkem a uznán, že je schopen samostatného podávání přípravku Winrevair.

1 Zkontrolujte přípravek Winrevair a dobu jeho použitelnosti

Balení přípravku Winrevair vyjměte z chladničky.

✓ U balení a pomůcek, které jsou jeho součástí **zkontrolujte dobu použitelnosti a zda nejsou poškozeny**.

⚠ Pokud doba použitelnosti uplynula nebo je balení či pomůcky poškozené, nepoužívejte je. Ihned se obraťte na svého lékaře nebo lékárníka, abyste dostal(a) nové balení.

✓ **Zkontrolujte, že opravdu máte lék**, který Vám lékař předepsal.

70121248/00-2

2 Balení nechejte ohřát na pokojovou teplotu, připravte si pomůcky a umyjte si ruce

K ohřátí léku na pokojovou teplotu vyčkejte 15 minut.

Injekční aplikace studeného léku je více bolestivá.

15 minut

Spolu s balením si připravte tyto pomůcky a najděte si čistý rovný povrch, kde si Vaši dávku připravíte a injikujete.

Nádoba na ostré předměty

Gáza, kousek vaty nebo náplast

Umyjte si ruce mýdlem a vodou.

Lék v prášku smíchejte do tekuté formy

Začněte s horní vložkou v krabičce



Použijte pomůcky z **horní vložky**

3 **Z balení vyjměte 1. injekční lahvičku, 1. předplněnou injekční stříkačku a 1. adaptér**



70121248/00-2

4a Zkontrolujte lék a injekční lahvičku



- Nepoškozena?
- Bez viditelných částic?
- Neuplynula doba použitelnosti?

Zkontrolujte štítek injekční lahvičky, **abyste se přesvědčil(a), že doba použitelnosti léku neuplynula.**

Zrakem zkontrolujte lék v práškové formě. Musí být bílý až bělavý a může vypadat jako celý nebo rozpadlý koláč.

⚠ Pokud doba použitelnosti přípravku uplynula, pokud je lék poškozený nebo v něm uvidíte cizí částice, nepoužívejte jej.

4b Sejměte plastový kryt a injekční lahvičku očistěte



Odtrhněte plastové víčko a **pryžovou zátku na vrchní části injekční lahvičky očistěte** tampónem s alkoholem.

⚠ Pokud víčko na injekční lahvičce chybí, nepoužívejte ji.

⚠ Očištěné pryžové zátky se nedotýkejte.

Injekční lahvičku odložte na čistou rovnou plochu.

Promíchejte

5a Adaptér přiložte na injekční lahvičku



Sloupněte obal adaptéru a vyjměte adaptér z obalu.

Adaptér uchopte za modré hrdlo a nasaďte jej na vrchní část injekční lahvičky.

⚠ Nedotýkejte se vnitřku adaptéru na injekční lahvičku, aby zůstal čistý a abyste se neporanil(a).

70121248/00-2

5b Adaptér nasaďte na injekční lahvičku



Jednou rukou držte injekční lahvičku. **Adaptér silně zatlačte dolů** tak, aby zapadl na své místo (můžete cítit jistý odpor).

5c Adaptér očistěte



Vršek adaptéru očistěte tampónem s alkoholem.

Promíchejte

6 Zkontrolujte předplněnou injekční stříkačku

Zkontrolujte, zda u přípravku neuplynula doba použitelnosti. Zrakem zkontrolujte, zda je sterilní voda v předplněné injekční stříkačce čirá.

- ✓ Nepoškozena?
- ✓ Čirá?
- ✓ Bez částic?
- ✓ Neuplynula doba použitelnosti?

⚠ Nepoužívejte, pokud uvidíte hrudky, částice, došlo ke změně barvy, nebo pokud u přípravku uplynula doba použitelnosti.

7 Z předplněné injekční stříkačky odlomte bílé víčko

Z předplněné injekční stříkačky podle perforace odlomte víčko.



⚠ Nedotýkejte se hrotu předplněné injekční stříkačky

⚠ Netlačte na píst, mohla by vytéct sterilní voda

70121248/00-2

8 Předplněnou injekční stříkačku připojte na adaptér

Nyní vezměte injekční lahvičku s lékem s nasazeným adaptérem.
Hrot předplněné injekční stříkačky nastavte proti modrému kolečku na adaptéru.

Předplněnou injekční stříkačku tlačte na adaptér a otáčejte jí tak dlouho, dokud to jde. Během otáčení se ujistěte, že držíte adaptér.



Promíchejte

9 Sterilní vodu z předplněné injekční stříkačky přemístěte do injekční lahvičky





Pomalu stlačte píst úplně dolů, čímž se všechna sterilní voda přemístí do injekční lahvičky (píst se pohne nahoru; to je normální).

Předplněnou injekční stříkačku nechejte nasazenou na injekční lahvičce a odložte stranou na rovný povrch.

70121248/00-2

10 Připravte si 2. injekční lahvičku, 2. předplněnou injekční stříkačku a 2. adaptér

Z balení vyjměte **2. injekční lahvičku, 2. předplněnou injekční stříkačku a 2. adaptér**.



⚠ Důležité:

K přípravě 2. injekční lahvičky se vraťte na stranu 13 a opakujte kroky **4** až **9**.

Promíchejte

1. injekční lahvička

2. injekční lahvička

Zastavte se a zkontrolujte, zda máte připravenou jak 1. tak i 2. injekční lahvičku.

Před tím, než přistoupíte ke kroku 11, musíte mít připraveny obě injekční lahvičky.

11 Krouživým pohybem promíchejte lék

⚠ Injekčními lahvičkami netřepejte.

Každou rukou držte jednu předplněnou injekční stříkačku s injekční lahvičkou a ***jemně*** **s oběma otáčejte krouživými pohyby**, dokud se prášek zcela nerozpustí. To může trvat až **2 minuty**. **Neprotřepávejte ani silně netřeste.**

Po důkladném smísení musí být lék čirý. Pokud není, tento krok opakujte, dokud nebude čirý.



Na každé injekční lahvičce **píst stlačte opět dolů**, abyste se ujistili, že je všechna tekutina v injekční lahvičce, protože část tekutiny by se mohla natáhnout zpět do injekční stříkačky (píst se pohne nahoru; to je normální).

70121248/00-2

12 Počkejte, až vymizí bubliny



Obě injekční lahvičky dejte stranou, aby došlo k vymizení bublin.
To může trvat až 3 minuty.

⚠ Než budete pokračovat, přesvědčte se, že lék v injekční lahvičce:

- ✓ je čirý až opalizující a bezbarvý až slabě hnědožlutý roztok,
- ✓ neobsahuje hrudky ani prášek,
- ✓ neobsahuje velké bubliny.

Je v pořádku, pokud je na okrajích injekční lahvičky drobná pěna (malé bublinky).

Promíchejte

13 Příprava injekční lahvičky odstraněním nadbytečného vzduchu



Začněte s libovolnou injekční lahvičkou. Zatímco je injekční lahvička ve svislé poloze, ***jemně* píst vytahujte nahoru** k horní části injekční stříkačky, ale dávejte pozor, abyste jej z injekční stříkačky nevytáhl(a).

Tip: Tímto krokem se pouze vytáhne z injekční lahvičky nadbytečný vzduch, aby se snížil tlak v injekční lahvičce a zabránilo se tak vytečení léku během odpojení injekční stříkačky.

⚠ Důležité:

Tento krok proveďte u **obou** injekčních lahviček. Před tím, než budete pokračovat se zastavte a zkontrolujte, že máte nachystány **obě** injekční lahvičky.

70121248/00-2

14 Předplněnou injekční stříkačku odpojte z injekční lahvičky

Promíchejte



Uchopte adaptéry a **obě** injekční stříkačky odšroubujte z injekčních lahviček.

Obě injekční stříkačky vyhoďte do nádoby na ostré předměty.



Obě injekční lahvičky s lékem mějte nachystané a připravené ke spojení v dalších krocích.

Slučte lék z obou injekčních lahviček

V dalších krocích budete potřebovat:
- 1. a 2. injekční lahvičku se smíseným lékem,
- pomůcky ze spodní vložky v krabičce.



Použijte pomůcky ze **spodní vložky**

15 Očistěte vrchní část obou adaptérů

Dvěma novými tampóny s alkoholem ze spodní vložky očistěte vrchní části adaptérů.



16 Prázdnou injekční stříkačku určenou k podání přípravku vyjměte z obalu

Ve spodní vložce najděte prázdnou injekční stříkačku k podání přípravku a vyjměte ji z obalu.

Tuto injekční stříkačku k podání přípravku použijete k odměření množství léku, které budete potřebovat (na základě Vaší předepsané dávky).



17 Do injekční stříkačky určené k podání přípravku natáhněte vzduch

⚠ Toto musíte udělat proto, aby se tlak v injekční lahvičce vyrovnal a abyste dostal(a) přesnou dávku.

Injekční stříkačku k podání přípravku držte svisle a píst potáhněte dolů tak, **abyste natáhli 1,5 ml vzduchu.**



Horní okraj pístu

Píst stahujte, dokud nebude jeho horní okraj na značce 1,5 ml

Tip: Jedna čárka (dílek) na injekční stříkačce odpovídá 0,1 ml.

70121248/00-2

18 Injekční stříkačku určenou k podání přípravku napojte na jednu z injekčních lahviček

Uchopte adaptér a našroubujte na něj injekční stříkačku k podání přípravku. Stříkačkou otáčejte tak dlouho, dokud to jde.



19 Do injekční lahvičky vtlačte vzduch, pak ji obraťte dnem vzhůru

Píst stlačte úplně dolů, aby se všechen vzduch přemístil do injekční lahvičky.

Poté palcem **držte píst na místě** a injekční lahvičku obraťte dnem vzhůru.



20 Z 1. injekční lahvičky natáhněte všechno léčivo

Píst pomalu stahujte zpět. **Zastavte se na 1,5 ml.**

Tímto zajistíte, že všechno léčivo z injekční lahvičky bude v injekční stříkačce k podání přípravku.

⚠ Netahejte píst za 1,5 ml. **Zastavte se na 1,5 ml.**

⚠ Dávejte pozor, abyste píst z injekční stříkačky k podání přípravku nevytáhli.

21 1. injekční lahvičku odpojte z injekční stříkačky k podání přípravku

Uchopte adaptér a naplněnou injekční stříkačku k podání přípravku odšroubujte z injekční lahvičky.

Prázdnou injekční lahvičku vyhoďte do nádoby na ostré předměty.



70121248/00-2

22 Injekční stříkačku určenou k podání přípravku připojte na 2. injekční lahvičku

Uchopte adaptér na 2. injekční lahvičce a našroubujte na něj částečně naplněnou injekční stříkačku k podání přípravku, dokud to jde.

⚠ Nedotýkejte se pístu, mohlo by dojít k úniku léčiva

23 Všechno léčivo vstříkněte do 2. injekční lahvičky, pak ji obraťte dnem vzhůru

Pro zajištění přesnosti dávky *pomalu* stlačte píst úplně dolů, čímž se **všechno léčivo** přenese **do injekční lahvičky**. Takto se léčivo z obou injekčních lahviček spojí.

Poté palcem **držte píst na místě** a injekční lahvičku obraťte dnem vzhůru.



Natáhněte svou předepsanou dávku

24 Píst stáhněte zpátky, čímž natáhnete svou dávku

Z injekční lahvičky a injekční stříkačky k podání přípravku, které jsou obrácené dnem vzhůru, **pomalu táhněte píst zpět.**

Přestaňte, jakmile se dostanete na **množství v mililitrech „ml“ uvedené ve Vašem předpise**.



Tip: Jedna čárka (dílek) na injekční stříkačce odpovídá 0,1 ml.

25 Zkontrolujte, zda nejsou přítomny vzduchové bubliny a vzduchové kapsy

Pohledem zkontrolujte, zda v injekční stříkačce nejsou velké vzduchové bubliny nebo vzduchová kapsa. Nadbytečný vzduch odstraníte v dalších krocích.



70121248/00-2

26 Odstraňte vzduchové bubliny a vzduchové kapsy

Pokud uvidíte vzduchové bubliny nebo vzduchovou kapsu, poklepejte na stěnu injekční stříkačky určené k podání přípravku, aby se vzduch posunul nahoru.

***Pomalým* zatlačením pístu nahoru**, odstraňte přebytečný vzduch.



K získání přesné dávky musíte odstranit velké bubliny a vzduchové kapsy

1 nebo 2 malé bubliny nevadí

27 Množství porovnejte s předepsanou dávkou

Po odstranění veškerého nadbytečného vzduchu **porovnejte množství s Vaší předepsanou dávkou.**

Pokud v injekční stříkačce nemáte Vaše předepsané množství, znovu ***pomalu*** táhněte píst zpět, čímž natáhnete další lék.

Kroky 24 až 26 opakujte, dokud nezískáte **Vaši předepsanou dávku** a nebudou vidět žádné velké bubliny.

Natáhněte

28 Zkontrolujte si Vaši předepsanou dávku

Než budete pokračovat, zkontrolujte, že v injekční stříkačce určené k podání přípravku máte předepsanou dávku.



Horní okraj pístu
má být v jedné linii
s Vaší předepsanou dávkou

⚠ **Pokud množství neodpovídá Vaší předepsané dávce, opakujte kroky 24 až 27.**

70121248/00-2

29 Injekční stříkačku určenou k podání přípravku odpojte z injekční lahvičky a odložte ji stranou



Jednou rukou držte píst na místě. Druhou rukou uchopte adaptér a odšroubujte naplněnou injekční stříkačku k podání přípravku z injekční lahvičky.

Injekční lahvičku vyhoďte do nádoby na ostré předměty.



Naplněnou injekční stříkačku k podání přípravku položte na čistý, rovný povrch.

⚠ Nedotýkejte se hrotu injekční stříkačky k podání přípravku ani nedovolte, aby se dotýkal nějakého povrchu.

Natáhněte

30 Nasaďte injekční jehlu

⚠ Nedotýkejte se napojovacího ústí injekční jehly.



Ve spodní vložce v krabičce najděte jehlu a otevřete její obal.



Zatímco jehla bude stále v obalu, **uchopte základnu injekční jehly a našroubujte ji na injekční stříkačku určenou k podání přípravku.** Otáčejte tak dlouho, dokud to půjde. Z jehly stáhněte obal.

Odklopte bezpečnostní kryt od injekční jehly, a to směrem k injekční stříkačce do zobrazeného úhlu. Injekční stříkačku k podání přípravku položte na čistý, rovný povrch.

⚠ Neodstraňujte kryt z jehly.

70121248/00-2

31 Zvolte místo k podání injekce a očistěte jej



Na břiše nebo na horní části stehna **si zvolte místo k podání injekce**. Pokud budete injekci podávat do oblasti břicha, vyhněte se oblasti 5 cm okolo pupku.

Při každém podání injekce zvolte jiné místo.

- ⚠ Injekci nepodávejte do kůže, která je poškozená, bolavá, zhmožděná nebo s rudými skvrnami.
- ⚠ Injekci nepodávejte přes oděv.

Místo k podání injekce očistěte novým tampónem s alkoholem.

- ⚠ Očištěného místa k podání injekce se již nedotýkejte.

Nyní jste připraveni k podání injekce

Natáhněte

Lék si injekčně aplikujte

32 Lék si injikujte



Z jehly rovným pohybem stáhněte kryt. Kryt jehly vyhoďte.

⚠ Nedotýkejte se pístu, dokud nebudete připraven(a) k podání injekce, aby nedošlo ke ztrátám léku.



V místě, kam budete injekci podávat, jemně **prsty stiskněte kůži a vytvořte kožní řasu**. **Pohybem jako při házení šipek** zaveďte jehlu **v úhlu 45 °až 90 °**. To vám usnadní podání injekce přímo pod kůži (subkutánní injekce).



Pomalým, rovnoměrným tlakem **zatlačte** na píst, a stlačte jej úplně dolů, dokud se injekční stříkačka určená k podání přípravku zcela nevyprázdní. **Přesvědčte se, že byl injikován všechen lék.** Kožní řasu nyní můžete pustit.

70121248/00-2

⚠ Stále dávejte pozor, abyste si jehlou neporanil(a) prsty.



Zatímco držíte píst stále zatlačený, **jehlu vytáhněte z kůže** ve stejném úhlu, ve kterém jste ji zavedl(a).



Bezpečnostní kryt znovu nasadíte tak, že ho zatlačíte proti rovnému povrchu, až uslyšíte cvaknutí a uvidíte, že jehla je zakryta.

Injekční stříkačku určenou k podání přípravku a použité pomůcky vyhoďte do nádoby na ostré předměty.

⚠ Jehlu z injekční stříkačky určené k podání přípravku neodstraňujte.

Likvidace přípravku Winrevair

Zeptejte se svého lékárníka, jak likvidovat léky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. Ujistěte se, že dodržujete místní požadavky na likvidaci, protože se mohou lišit od obecných doporučení uvedených níže.

- Veškeré použité injekční lahvičky (včetně veškeré zbývající tekutiny přípravku Winrevair), injekční jehly, víčka injekční lahvičky a kryty jehly, a použité injekční stříkačky vyhoďte do nádoby na ostré předměty.

- Injekční lahvičky s přípravkem Winrevair, injekční stříkačky ani jehly nevyhazujte do domácího odpadu.
- **Žádné pomůcky nepoužívejte opakovaně.** Tento přípravek je jednorázový a může se použít pouze jednou.
- **Důležité:** nádobu na ostré předměty vždy uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.

70121248/00-2

Pokud nádobu na ostré předměty nemáte, můžete použít odpadkový koš, který:

- je vyroben z tvrdého plastu,
- lze jej uzavřít pevně doléhajícím víkem, které je odolné proti propíchnutí, a znemožní proniknutí ostrých předmětů ven,
- stojí rovně a je stabilní,
- je nepropustný,
- a je řádně označen, že uvnitř obsahuje nebezpečný odpad.

Až bude nádoba téměř plná, postupujte podle místních předpisů pro správnou likvidaci obsahu nádoby.

⚠ Nádobu nepoužívejte opakovaně.

Často kladené otázky

Co mám dělat, když místo vpichu krvácí?
Na kůži si ihned přiložte vatový tampón nebo obvaz a lehce na něj přitlačte. Pokud se krvácení nezastaví, ihned se obraťte na svého lékaře nebo lékárníka.

Kde najdu množství léku, které mi bylo předepsáno?
Vaše předepsané množství léku je uvedeno na lékařském předpise v mililitrech „ml“. Pokud nemůžete najít svou předepsanou dávku, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.

Co mám dělat, pokud se mi nějaké množství léku náhodně dostane na kůži nebo vyteče na pracovní povrch?
Místo ihned důkladně omyjte mýdlem a vodou.

Co mám dělat, když si nejsem jistý(á), že jsem si předepsanou dávku podal(a) správně?
Obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.

70121248/00-2

Co mám dělat, když se píst injekční stříkačky určené k podání přípravku pohybuje automaticky, když se snažím natáhnout lék z injekční lahvičky?

Pokud se píst mírně pohybuje sám, když plníte injekční stříkačku určenou k podání přípravku lékem, ničeho se neobávejte.

Jednou rukou **podržte píst na místě, aby se nepohyboval.**

Druhou rukou z injekční stříkačky určené k podání přípravku odšroubujte injekční lahvičku. Jakmile bude odšroubovaná, můžete píst bez obav pustit.

Těmto automatickým pohybům pístu můžete předejít tím, že do injekční lahvičky před naplněním injekční stříkačky určené k podání přípravku lékem natlačíte vzduch. Podrobné pokyny najdete v krocích 17 až 28.

Co mám dělat, pokud jsou jednotlivé součásti balení poškozeny nebo narušeny (například došlo ke změně barvy, je přítomen zákal, nebo obsahuje částice)?

Pokud jsou jednotlivé součásti balení poškozeny nebo narušeny, nepoužívejte je. Obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka a požádejte o nové balení.

Co mám dělat, pokud lék po smísení a promíchání není čirý?

Lék nepoužívejte, pokud jste injekční lahvičkou s lékem kroužil(a) přibližně 2 minuty a nechal(a) ji stát další 3 minuty, ale lék v injekční lahvičce je stále zakalený nebo obsahuje hrudky, prášek nebo cizí částice. Obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka, požádejte o nové balení.

Co mám dělat, když z předplněné injekční stříkačky nebude sterilní voda vytékat?

Zkontrolujte, že je adaptér na injekční lahvičce pevně připojen. Pokud není, uchopte injekční lahvičku a silně zatlačte adaptér na injekční lahvičku, abyste se ujistili, že adaptér prorazil pryžovou zátku injekční lahvičky.

Co mám dělat, když mi pomůcky z balení upadnou?

Pokud jsou nějaké pomůcky poškozené, nepoužívejte je. Pokud si nejste jistý(á), obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka, pořádejte o nové balení.

70121248/00-2

Mohu použít balení, které bylo ponecháno mimo chladničku?

Pokud bylo nepoužité balení delší dobu mimo chladničku, prosím obraťte se před dalším použitím na svého lékaře nebo lékárníka.

Musím smísený lék použít ihned?

Doporučujeme lék podat injekcí ihned po smísení, nejpozději však do 4 hodin po smísení. Pokud uplynuly více jak 4 hodiny, nepoužitý smísený lék zlikvidujte. Pokud máte otázky k postupu nebo si ohledně postupu nejste jistý(á), obraťte se prosím na svého lékaře nebo lékárníka.

Jak mohu získat pomoc při přípravě a podávání injekce?

Pokud máte otázky ke správnému podávání přípravku Winrevair, nebo potřebujete další informace, můžete se obrátit na svého lékaře nebo lékárníka.

70121248/00-2 5068, 5069

Ohledně dalších informací o tomto léčivém přípravku se prosím obraťte na svého lékaře nebo lékárníka nebo místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci. Kontakt na místního zástupce naleznete v příbalové informaci: informaci pro pacienta.

Tato brožura byla naposledy revidována v březnu 2025.