


DŮLEŽITÉ: před použitím si přečtěte tuto **brožuru** CS

Návod k použití



WINREVAIR[®] sotatercept
45 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok
(souprava s 1 injekční lahvičkou)
60 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok
(souprava s 1 injekční lahvičkou)

Tato brožura obsahuje pokyny, jak připravit a aplikovat přípravek Winrevair ve formě prášku a rozpouštědla pro injekční roztok. Příbalová informace, která je rovněž součástí balení, obsahuje všechny pro Vás důležité informace.


Dávka je založena na pacientově tělesné hmotnosti
Pouze pro podkožní (s.c.) injekci (injikujte přímo pod kůži)

Důležité

Smíchejte

Naláhněte

Injikujte



Obsah brožury:

Dříve než začnete4

Důležité informace pro zdravotníky5

Seznamte se s částmi obsaženými v balení6

Co je důležité vědět před podáním injekce8

Jak balení uchovávat.9

Začínáme.....10

● Lék v prášku **smíchejte** do tekuté formy12

● **Natáhněte** předepsanou dávku24

● Lék si **injikujte**34

Likvidace přípravku Winrevair36

Často kladené otázky38

Dříve než začnete

Přečtěte si tuto brožuru

Před prvním použitím přípravku Winrevair a před každým dalším podáním si od začátku do konce přečtěte tyto pokyny. Mohou v nich být nové informace.

Začínajte pod dohledem lékaře nebo zdravotní sestry

Přípravek Winrevair nepoužívejte, dokud Vám nebo Vašemu pečovateli lékař nebo zdravotní sestra neukážou, jak jej správně připravit a injikovat. Lékař nebo zdravotní sestra Vám mají před prvním použitím ukázat, jak přípravek Winrevair injikovat.

Máte nějaké otázky?

Pokud se ke správnému podávání přípravku Winrevair chcete na něco zeptat, nebo pokud potřebujete další informace, poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.



Důležité informace pro zdravotníky

Důležité


Zdravotnický pracovník poskytne školení týkající se správné přípravy a podávání přípravku Winrevair krok za krokem podle této brožury „Návod k použití“ a rozhodne, zda pacient nebo pečovatel jsou schopni přípravek Winrevair připravovat a podávat samostatně.

Přesvědčte se, že pacient nebo pečovatel dokážou správně udělat následující:

1. Rekonstituovat lék
2. Odměřit správné množství léku podle pacientova lékařského předpisu
3. Zvolit a připravit správné místo k podání injekce
4. Lék podkožně injikovat

Seznamte se s částmi obsaženými v balení


Horní vložka v krabičce: používá se ke smísení léku




- A** Injekční lahvička s práškem přípravku Winrevair
Lék v práškové formě
- B** 1 Předplněná injekční stříkačka (rozpouštědlo) se sterilní vodou ke smísení léku na tekutinu
- C** 1 Adaptér na injekční lahvičku (dále jen „adaptér“) sloužící k propojení injekční lahvičky a injekční stříkačky

Spodní vložka v krabici:

používá se k **injekčnímu podání léku**




D



1 Injekční jehla

E



1 Prázdná injekční stříkačka sloužící k odměření, natažení a injekčnímu podání léku

F



4 Tampóny s alkoholem (2 v každé vložce)

Co je důležité vědět před podáním injekce

- Před použitím musíte tento přípravek promísit. Přesvědčte se, že při podání injekce je prášek s lékem v injekční lahvičce zcela rozpuštěn.
- **Při každém podání přípravku zkontrolujte předepsanou dávku (množství v mililitrech). Předepsaná dávka se může měnit.**
- Při přípravě Vaší předepsané dávky používejte pouze pomůcky obsažené v balení.
- Balení neotevírejte ani lék nesmíchávejte, dokud nebudete připraveni jej použít.
- **Žádné pomůcky nepoužívejte opakovaně.** Po podání injekce veškerý nepoužitý léčivý přípravek a použité pomůcky zlikvidujte v souladu s místními požadavky. Viz strany 36–37, kde naleznete další informace.

Jak balení uchovávat

- Celé balení uchovávejte v chladničce, ale chraňte před mrazem.
- Lék a pomůcky uchovávejte v balení a chraňte před světlem.
- Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí a domácích zvířat.

Začínáme

Každý pacient nebo pečovatel, který má připravovat a injikovat přípravek Winrevair, musí být nejprve proškolen zdravotníkem a uznán, že je schopen samostatného podávání přípravku Winrevair.

1 Zkontrolujte přípravek Winrevair a dobu jeho použitelnosti

Balení přípravku Winrevair vyjměte z chladničky.


✓ U balení a pomůcek, které jsou jeho součástí, **zkontrolujte dobu použitelnosti a zda nejsou poškozeny**.

⚠ Pokud doba použitelnosti uplynula nebo je balení či pomůcky poškozené, nepoužívejte je. Ihned se obraťte na svého lékaře nebo lékárníka, abyste dostal(a) nové balení.

✓ **Zkontrolujte, že opravdu máte lék**, který Vám lékař předepsal.

2 Balení nechejte ohřát na pokojovou teplotu, připravte si pomůcky a umyjte si ruce

K ohřátí léku na pokojovou teplotu vyčkejte 15 minut. Injekční aplikace studeného léku je více bolestivá.




15 minut

Spolu s balením si připravte tyto pomůcky a najděte si čistý rovný povrch, kde si Vaši dávku připravíte a injikujete.




Nádoba na ostré předměty



Gáza, kousek vaty nebo náplast


Umyjte si ruce mýdlem a vodou.




Důležité

Lék v prášku smíchejte do tekuté formy

Začněte s horní vložkou v krabičce



3 Z balení vyjměte injekční lahvičku, předplněnou injekční stříkačkou a adaptér



4a Zkontrolujte lék a injekční lahvičku




- ✓ Nepoškozena?
- ✓ Bez viditelných částic?
- ✓ Neuplynula doba použitelnosti?

Zkontrolujte štítek injekční lahvičky, **abyste se přesvědčil(a), že doba použitelnosti léku neuplynula.**

Zrakem zkontrolujte lék v práškové formě. Musí být bílý až bělavý a může vypadat jako celý nebo rozpadlý koláč.

⚠ Pokud doba použitelnosti přípravku uplynula, pokud je lék poškozený nebo v něm uvidíte cizí částice, nepoužívejte jej.

4b Sejměte plastový kryt a injekční lahvičku očistěte



Odtrhněte plastové víčko a **pryžovou zátku na vrchní části injekční lahvičky očistěte** tampónem s alkoholem.


⚠ Pokud víčko na injekční lahvičce chybí, nepoužívejte ji

⚠ Očištěné pryžové zátky se nedotýkejte

Injekční lahvičku odložte na čistou rovnou plochu.

Smíchejte

5a Adaptér přiložte na injekční lahvičku




Sloupněte obal adaptéru a vyjměte adaptér z obalu.



Adaptér uchopte za modré hrdlo


Jak adaptér nasadit:



Adaptér uchopte za modré hrdlo a nasadte jej na vrchní část injekční lahvičky.


⚠ Nedotýkejte se vnitřku adaptéru na injekční lahvičku, aby zůstal čistý a abyste se neporanil(a).

5b Adaptér nasadíte na injekční lahvičku



Jednou rukou držte injekční lahvičku. **Adaptér silně zatlačte dolů** tak, aby zapadl na své místo (můžete cítit jistý odpor).


5c Adaptér očistěte



Smíchejte

6 Zkontrolujte předplněnou injekční stříkačku

Zkontrolujte, zda u přípravku neuplynula doba použitelnosti. Zrakem zkontrolujte, zda je sterilní voda v předplněné injekční stříkačce čirá.




- ✓ Nepoškozena?
- ✓ Čirá?
- ✓ Bez částic?
- ✓ Neuplynula doba použitelnosti?

⚠ Nepoužívejte, pokud uvidíte hrudky, částice, došlo ke změně barvy, nebo pokud u přípravku uplynula doba použitelnosti.

7 Z předplněné injekční stříkačky odlomte bílé víčko

Z předplněné injekční stříkačky podle perforace odlomte víčko.




Smíchejte

8 Předplněnou injekční stříkačku připojte na adaptér

Nyní vezměte injekční lahvičku s lékem s nasazeným adaptérem.
Hrot předplněné injekční stříkačky nastavte proti modrému kolečku na adaptéru.


Předplněnou injekční stříkačku tlačte na adaptér a otáčejte jí tak dlouho, dokud to jde. Během otáčení se ujistěte, že držíte adaptér.

Zatlačte, pak otáčejte,
dokud se nepřipojí




⚠ Netlačte na píst, mohla by vytéct sterilní voda

9 Sterilní vodu z předplněné injekční stříkačky přemístíte do injekční lahvičky



Pomalu
stlače píst
úplně dolů




Přesvědčte se,
že se do injekční
lahvičky přemístila
všechna sterilní
voda

Pomalu stlače píst úplně dolů, čímž se všechna sterilní voda přemístí do injekční lahvičky (píst se pohne nahoru; to je normální).


Smíchejte

10 Krouživým pohybem promíchejte lék

Míchejte
krouživými
pohyby




⚠ Injekční lahvičkou netřepajte
Držte předplněnou injekční
stříkačku s **injekční
lahvičkou a jemně
otáčejte krouživými
pohyby**, dokud se prášek
zcela nerozpustí. To
může trvat až **2 minuty**.
**Neprotřepávejte ani silně
netřeste.**



Čiré a bez
hrudek a bílého
prášku?


Po důkladném
smísení musí být
lék čirý. Pokud
není, tento krok
opakujte, dokud
nebude čirý.



Píst stlačte
úplně dolů

Píst stlačte opět dolů,
abyste se ujistili, že
je všechna tekutina
v injekční lahvičce,
protože část tekutiny
by se mohla natáhnout
zpět do injekční
stříkačky (píst se pohne
nahoru; to je normální).

11 Počkejte, až vymizí bubliny



3 minuty

Injekční lahvičku dejte stranou, aby došlo k vymizení bublin.
To může trvat až 3 minuty.


⚠ Než budete pokračovat, přesvědčte se, že lék v injekční lahvičce:

- ✓ je čirý až opalizující a bezbarvý až slabě hnědožlutý roztok,
- ✓ neobsahuje hrudky ani prášek,
- ✓ neobsahuje velké bubliny.


Je v pořádku, pokud je na okrajích injekční lahvičky drobná pěna (malé bublinky).

Smíchejte


12 Příprava injekční lahvičky odstraněním nadbytečného vzduchu




13 Předplněnou injekční stříkačku odpojte z injekční lahvičky



Uchopte adaptér a injekční stříkačku
odšroubujte z injekční lahvičky.
Injekční stříkačku vyhoďte do nádoby
na ostré předměty.



Prázdnou předplněnou
injekční stříkačku
vyhoďte




Injekční lahvičku s lékem mějte
nachystanou a připravenou
k použití v dalších krocích.

Natáhněte svou předepsanou dávku


V dalších krocích budete potřebovat:

- injekční lahvičku se smíseným lékem,
- pomůcky ze spodní vložky v krabičce



14 Očistěte vrchní část adaptéru


Novým tampónem s alkoholem ze spodní vložky očistěte vrchní část adaptéru.



15 Prázdnou injekční stříkačku určenou k podání přípravku vyjměte z obalu

Ve spodní vložce najdete prázdnou injekční stříkačku k podání přípravku a vyjměte ji z obalu.

Tuto injekční stříkačku k podání přípravku použijete k odměření množství léku, které budete potřebovat (na základě Vaší předepsané dávky).




Nedotýkejte se hrotu injekční stříkačky k podání přípravku

Naláhněte

16 Do injekční stříkačky určené k podání přípravku natáhněte vzduch

⚠ Toto musíte udělat proto, aby se tlak v injekční lahvičce vyrovnal a abyste dostal(a) přesnou dávku.

K natažení vzduchu do injekční stříkačky držte injekční stříkačku svisle a píst potáhněte dolů. **Zastavte se na množství v mililitrech „ml“** uvedeném ve Vašem lékařském předpise.




Horní okraj pístu

Píst stahujte, dokud nebude jeho horní okraj na předepsané dávce

Tip: Jedna čárka (dílek) na injekční stříkačce odpovídá 0,1 ml.

17 Injekční stříkačku určenou k podání přípravku napojte na injekční lahvičku


Uchopte adaptér a našroubujte na něj injekční stříkačku k podání přípravku. Stříkačkou otáčejte tak dlouho, dokud to jde.



18 Do injekční lahvičky vtlačte vzduch, pak ji obraťte dnem vzhůru

Píst stlačte úplně dolů, aby se všechen vzduch přemístil do injekční lahvičky.

Poté palcem **držte píst na místě** a injekční lahvičku obraťte dnem vzhůru.




Naláhněte

19 Píst stáhněte zpátky, čímž natáhnete svou dávku

Z injekční lahvičky a injekční stříkačky k podání přípravku, které jsou obrácené dnem vzhůru, **pomalů táhněte píst zpět**.

Přestaňte, jakmile se dostanete na **množství v mililitrech „ml“ uvedené ve Vašem předpise**.



⚠ Horní okraj pístu má být v jedné linii s Vaší předepsanou dávkou


Tip: Jedna čárka (dílek) na injekční stříkačce odpovídá 0,1 ml.

20 Zkontrolujte, zda nejsou přítomny vzduchové bubliny a vzduchové kapsy

Pohledem zkontrolujte, zda v injekční stříkačce nejsou velké vzduchové bubliny nebo vzduchová kapsa. Nadbytečný vzduch odstraníte v dalších krocích.



Velké vzduchové bubliny




Vzduchová kapsa

21 Odstraňte vzduchové bubliny a vzduchové kapsy

Pokud uvidíte vzduchové bubliny nebo vzduchovou kapsu, poklepejte na stěnu injekční stříkačky určené k podání přípravku, aby se vzduch posunul nahoru.

Pomalým zatlačením pístu nahoru odstraňte přebytečný vzduch.



22 Množství porovnejte s předepsanou dávkou

Po odstranění veškerého nadbytečného vzduchu **porovnejte množství s Vaší předepsanou dávkou.**

Pokud v injekční stříkačce nemáte Vaše předepsané množství, znovu *pomalou* táhněte píst zpět, čímž natáhnete další lék.


Kroky 19 až 21 opakujte, dokud nezískáte **Vaši předepsanou dávku** a nebudou vidět žádné velké bubliny.



Natáhněte

23 Zkontrolujte si Vaši předepsanou dávku


Než budete pokračovat, zkontrolujte, že v injekční stříkačce určené k podání přípravku máte předepsanou dávku.



Horní okraj pístu
má být v jedné linii s Vaší
předepsanou dávkou

⚠ Pokud množství neodpovídá Vaší předepsané dávce, opakujte kroky 19 až 22.


24 Injekční stříkačku určenou k podání přípravku odpojte z injekční lahvičky a odložte ji stranou




Naléhavě

25 Nasadíte injekční jehlu


⚠ Nedotýkejte se
napojovacího ústí
injekční jehly.



Ve spodní vložce
v krabičce najdete
jehlu a otevřete
její obal.




Zatímco jehla bude
stále v obalu, **uchopte
základnu injekční
jehly a našroubujte ji
na injekční stříkačku
určenou k podání
přípravku.** Otáčejte tak
dlouho, dokud to půjde.
Z jehly stáhněte obal.



**Odklopte bezpečnostní
kryt od injekční jehly,**
a to směrem k injekční
stříkačce do zobrazeného
úhlu. Injekční stříkačku
k podání přípravku
položte na čistý, rovný
povrch.

⚠ Neodstraňujte kryt
z jehly.


26 Zvolte místo k podání injekce a očistěte jej



Na břiše nebo na horní části stehna si **zvolte místo k podání injekce**. Pokud budete injekci podávat do oblasti břicha, vyhněte se oblasti 5 cm okolo pupku.

Při každém podání injekce zvolte jiné místo.

- ⚠ Injekci nepodávejte do kůže, která je poškozená, bolavá, zhmožděná nebo s rudými skvrnami.
- ⚠ Injekci nepodávejte přes oděv.



Místo k podání injekce očistěte novým tampónem s alkoholem.


- ⚠ Očištěného místa k podání injekce se již nedotýkejte.

Nyní jste připraveni k podání injekce.

Naláhněte


Lék si injekčně aplikujte

27 Lék si injikujte




Z jehly rovným pohybem stáhněte kryt. Kryt jehly vyhod'te.

⚠ Nedotýkejte se pístu, dokud nebudete připraven(a) k podání injekce, aby nedošlo ke ztrátám léku.




V místě, kam budete injekci podávat, jemně **prsty stiskněte kůži a vytvořte kožní řasu**. **Pohybem jako při házení šipek** zaveďte jehlu v úhlu **45 ° až 90 °**. To vám usnadní podání injekce přímo pod kůži (subkutánní injekce).




Pomalým, rovnoměrným tlakem **zatlačte** na píst a stlačte jej úplně dolů, dokud se injekční stříkačka určená k podání přípravku zcela nevyprázdní. **Přesvědčte se, že byl injikován všechn lék**. Kožní řasu nyní můžete pustit.


⚠ Stále dávejte pozor, abyste si jehlou neporani(a) prsty.



Zatímco držíte píst stále stlačený, **jehlu vytáhněte z kůže** ve stejném úhlu, ve kterém jste ji zavedl(a).



Bezpečnostní kryt znovu nasadíte tak, že ho zatlačíte proti rovnému povrchu, až uslyšíte cvaknutí a uvidíte, že jehla je zakryta.



Injekční stříkačku určenou k podání přípravku a použité pomůcky vyhodte do nádoby na ostré předměty.

⚠ Jehlu z injekční stříkačky určené k podání přípravku neodstraňujte.

Likvidace přípravku Winrevair

Zeptejte se svého lékaře, jak likvidovat léky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. Ujistěte se, že dodržujete místní požadavky na likvidaci, protože se mohou lišit od obecných doporučení uvedených níže.

- Veškeré použité injekční lahvičky (včetně veškeré zbývající tekutiny přípravku Winrevair), injekční jehly, víčka injekční lahvičky a kryty jehly, a použité injekční stříkačky vyhodte do nádoby na ostré předměty.
- Injekční lahvičky s přípravkem Winrevair, injekční stříkačky ani jehly nevyhazujte do domácího odpadu.
- **Žádné pomůcky nepoužívejte opakovaně.** Tento přípravek je jednorázový a může se použít pouze jednou.
- **Důležité:** nádobu na ostré předměty vždy uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.



Pokud nádobu na ostré předměty nemáte, můžete použít odpadkový koš, který:

- je vyroben z tvrdého plastu,
- lze jej uzavřít pevně doléhajícím víkem, které je odolné proti propíchnutí, a znemožní proniknutí ostrých předmětů ven,
- stojí rovně a je stabilní,
- je nepropustný,
- a je řádně označen, že uvnitř obsahuje nebezpečný odpad.

Až bude nádoba téměř plná, postupujte podle místních předpisů pro správnou likvidaci obsahu nádoby.

 Nádobu nepoužívejte opakovaně.

Často kladené otázky

Co mám dělat, když místo vpichu krvácí?

Na kůži si ihned přiložte vatový tampón nebo obvaz a lehce na něj přitlačte.
Pokud se krvácení nezastaví, ihned se obraťte na svého lékaře nebo lékárníka.

Kde najdu množství léku, které mi bylo předepsáno?

Vaše předepsané množství léku je uvedeno na lékařském předpise v mililitrech „ml“.
Pokud nemůžete najít svou předepsanou dávku, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.

Co mám dělat, pokud se mi nějaké množství léku náhodně dostane na kůži nebo vyteče na pracovní povrch?

Místo ihned důkladně omyjte mýdlem a vodou.

Co mám dělat, když si nejsem jistý(á), že jsem si předepsanou dávku podal(a) správně?

Obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.

Co mám dělat, když se píst injekční stříkačky určené k podání přípravku pohybuje automaticky, když se snažím natáhnout lék z injekční lahvičky?

Pokud se píst mírně pohybuje sám, když plníte injekční stříkačku určenou k podání přípravku lékem, ničeho se neobávejte.

Jednou rukou **podržte píst na místě, aby se nepohyboval**.

Druhou rukou z injekční stříkačky určené k podání přípravku odšroubujte injekční lahvičku. Jakmile bude odšroubovaná, můžete píst bez obav pustit.

Těmto automatickým pohybům pístu můžete předejít tím, že do injekční lahvičky před naplněním injekční stříkačky určené k podání přípravku lékem natlačíte vzduch. Podrobné pokyny najdete v krocích 16 až 23.

Co mám dělat, pokud jsou jednotlivé součásti balení poškozeny nebo narušeny (například došlo ke změně barvy, je přítomen zákal, nebo obsahují částice)?

Pokud jsou jednotlivé součásti balení poškozeny nebo narušeny, nepoužívejte je. Obrátte se na svého lékaře nebo lékárníka a požádejte o nové balení.

Co mám dělat, pokud lék po smísení a promíchání není čirý?

Lék nepoužívejte, pokud jste injekční lahvičkou s lékem kroužil(a) přibližně 2 minuty a nechal(a) ji stát další 3 minuty, ale lék v injekční lahvičce je stále zakalený nebo obsahuje hrudky, prášek nebo cizí částice. obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka a požádejte o nové balení.

Co mám dělat, když z předplněné injekční stříkačky nebude sterilní voda vytékat?

Zkontrolujte, že je adaptér na injekční lahvičce pevně připojen. Pokud není, uchopte injekční lahvičku a silně zatlačte adaptér na injekční lahvičku, abyste se ujistili, že adaptér prorazil pryžovou zátku injekční lahvičky.

Co mám dělat, když mi pomůcky z balení upadnou?

Pokud jsou nějaké pomůcky poškozené, nepoužívejte je. Pokud si nejste jistý(á), obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka a požádejte o nové balení.

Mohu použít balení, které bylo ponecháno mimo chladničku?

Pokud bylo nepoužité balení delší dobu mimo chladničku, prosím obraťte se před dalším použitím na svého lékaře nebo lékárníka.

Musím smísený lék použít ihned?

Doporučujeme lék podat injekcí ihned po smísení, nejpozději však do 4 hodin po smísení. Pokud uplynuly více jak 4 hodiny, nepoužitý smísený lék zlikvidujte. Pokud máte otázky k postupu nebo si ohledně postupu nejste jistý(á), obraťte se prosím na svého lékaře nebo lékárníka.

Jak mohu získat pomoc při přípravě a podávání injekce?

Pokud máte otázky ke správnému podávání přípravku Winrevair, nebo potřebujete další informace, můžete se obrátit na svého lékaře nebo lékárníka.

Ohledně dalších informací o tomto léčivém přípravku se prosím obraťte na svého lékaře nebo lékárníka nebo místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci. Kontakt na místního zástupce naleznete v příbalové informaci: informaci pro pacienta.

Tato brožura byla naposledy revidována v březnu 2025.

70121575/00-2

5068, 5069

